

Verenigde Fuchsia- en
Kuiplanten Liefhebbers

Jaargang 26 nr 1

VFKL

februari 2018

CultiVaria

Winter is
Mijn bondgenoot
In warme, zoete kilte

Witte sneeuw
Omsluit de aarde
Het leven? Bruist in stilte.
Itisberga.

Verenigde Fuchsia- en
Kuiplanten
Liefhebbers

Inhoudsopgave

Pagina

Wat mankeert deze Tibouchina .	2
Vroeg uitlopende fuchsias's.	2
Concept activiteitenplan 2018:	4
Kerst 2017	5
De meikever en uw gras.	6
Twel's Klumpke.	7
Mooi, maar geen opvallende bloemen.	9
Helleborusbladeren verwijderen.	13
Problemen met de Chinese roos.	14
Het is groen (puzzel).	15
Doen planten ook aan seks?	16
De koningin van de winter.	19
De krokus geeft de lente aan.	21
Colofon	27

Wat mankeert deze Tibouchina?



De Tibouchina is afkomstig uit Zuid-Amerika en moet, zoals vele kuipplanten, overwinteren op een lichte, koele plaats, alwaar de plant heel weinig water krijgt. Voor de overwintering is een temperatuur tussen plus 5 en 10°C voldoende.

Bovenstaande plant is te zeer vertroeteld. Zo te zien staat ze op een, naar ik meen, te warme kamer met een te lage

Beste lezer:

Het grootste gedeelte van de teksten in CultiVaria komt van mijn hand. De meeste onderwerpen zijn een gevolg van eigen ervaringen in mijn tuin, maar.....na zoveel jaren raken mijn onderwerpen uitgeput en het kan dus voorkomen dat er herhalingen ontstaan. Mijn excuses daarvoor.

Ik wil elke lezer vragen mij te helpen. Reik mij een onderwerp aan, mail ervaringen met betrekking tot het hebben en houden van planten door. Taalfouten maken mag. Daar kijk ik doorheen en ik zorg ervoor dat de teksten in CultiVaria normaal leesbaar zijn. Uw ervaringen zijn een leerschool voor anderen en zorgen ervoor dat de kennis wordt uitgebreid.

Doen!

H. Stoffels

luchtvochtigheid. De bladeren verdrogen. Hoe het met de watergift is weet ik niet, maar al mocht de plant regelmatig water krijgen, dan helpt dat niet. Integendeel. Wanneer de bladeren verwelken is er geen verdamping en blijft de wortelkluit te nat met als gevolg dat er wortelrot ontstaat en de plant daardoor nog eerder sterft.

Voor bovenstaande plant is nog redding mogelijk. Naar een plaats waar voldoende luchtvochtigheid is en de plant niet te veel water krijgt.

Vroeg uitlopende fuchsia's.

Wat het jaargetijde betreft zitten we in de winter, maar daar is buiten nog weinig van te merken. Heel veel regen, geen lage temperaturen en veel wind kenmerken deze winter. Een winter die qua temperatuur gerangschikt wordt bij de top tien van de warmste winters. Geen wonder dat





de fuchsia's in onze kassen alweer vol zitten met uitlopers. Op het moment dat ik dit schrijf is het eind januari. Van een van de leden kreeg ik enkele foto's van fuchsia's die al extreem lange scheuten hebben, maar deze liefhebber moet ze laten overwinteren in een kelder. In de kelder zijn de temperaturen al aan de hoge kant en lopen de planten al snel uit. Wanneer ik naar de scheuten kijk zie

ik nog mooie, frisgroene scheuten en dat komt doordat in de kelder het licht brandt. Zou dat niet zo zijn dan waren de scheuten nog veel langer en bovendien geel van kleur.

Wat kan deze liefhebber verder doen?

De scheuten zijn geschikt om te stekken. Dat kan gebeuren in een stekbak bij een temperatuur van ongeveer 20°C. Natuurlijk moet er licht aanwezig zijn. Heeft de eigenaar geen zin om te stekken, dan moet er voorlopig niets gebeuren. De planten in leven houden, een beetje water geven en wachten tot eind maart. Dan kunnen de inmiddels lange, toch wat gerekte stekken heel ver teruggeknipt worden en moeten de planten weer opnieuw uitlopen. Hulp hierbij kan geboden worden door voeding, immers

de planten hebben veel energie verspeeld. Voeding zou kunnen zijn een mengsel van beendermeel en DCM.

De planten moeten daarna zo snel mogelijk naar buiten alwaar ze kunnen afharden en stevige scheuten kunnen vormen. Toch is het nog oppassen, want pas na de IJsheiligen is het vorstgevaar helemaal geweken.

H. Stoffels.

De eerste klap is een daalder waard.

Sinds de invoering van de Euro hebben we geen (rijks)daalder meer, maar de betekenis van de zegswijze blijft natuurlijk bestaan. Zo kan men in februari een eerste slag toebrengen aan de spintmijten. Zij zitten verstopt tussen de bast van wat oudere fuchsia's en kuipplanten. De spintmijten overleven echter meestal als eieren. Door ze nu op een mooie februaridag te bestrijden met een middel dat zowel volwassen dieren als larven en eieren doodt, zorgt men ervoor dat er in de zomer niet snel een plaag uitbreekt. Een hulpmiddel is Promonal-R maar men moet alle delen van de planten goed raken. Natuurlijk kan men ook gebruik maken van roofmijten, maar dat moet in een ander jaargetijde gebeuren omdat de temperaturen nu te laag zijn. Op kamerplanten kan men de spintmijten bestrijden door de planten dagelijks nat te nevelen op zowel de bovenkant als de onderkant van de bladeren.

Bloemenhof
'De Hommert'

Hommertweg 1
6361 HR Vaesrade Nuth
Tel 046-4422888



Concept activiteitenplan 2018

maand	datum	activiteit	opmerking	uitvoerders
februari	do 22	ledenvergadering (19:00)		Bestuur
		agendapunten		Gespreksleider/voorzitter
		-lezing Yvonne de Hoog	fuchsia/pelargonium	Hub Stoffels
		-activiteitenplan 2018		Gespreksleider/voorzitter
		-begroting 2018		Penningmeester
maart	za 10	bezoek aan kweker	v/d Velde Heerde	activiteiten-commissie
		orchideeënkwekerij Molenhoek	Bemmel	activiteiten-commissie
	do 29	Bloemschikken (Pasen)		Michel Veldman
april	do 19	Jaarvergadering 19:30		Bestuur
		agenda		Gespreksleider
		-jaarverslag		Annelies Hellenbrand
		-fin jaarverslag		Jan Ramaekers
		-bestuursverkiezing	Nieuwe voorzitter	Bestuur
		-nieuwe voorzitter		Leden
		-pauze koffie/vlaai		activiteiten-commissie
		-plant voor het voetlicht		Hub Stoffels
		-tombola		Bestuur
mei	do ?	info avond voor nieuwe leden	behoefte peilen	Bestuur
juni	zo 24	Busreis		activiteiten-commissie
		Anfra Grashoek	entree 3 euro	
		Piet en Nel Hanssen Grashoek		
juli	do 5	Plantenveiling		Bestuur
	za 7	Kuipplantenveiling Haelen		14:00-17:00 regio 3
	do 12	Ledenvergadering 19:30		Bestuur
		-agenda		Voorzitter
		-plant voor het voetlicht		Hub Stoffels
		-tombola		Bestuur
	zo 22	open tuin leden		
augustus	zo 5	oude ambachten Einighausen		Bestuur/Leden
september	zo 23	activiteit leden	gezellig samen zijn	Bestuur
oktober	do 18	Ledenvergadering 19:30		Bestuur
		-agenda		Voorzitter
		-grote clubactie		Annelies Hellenbrand
		-contributie		Jan Ramaekers
		-winterberging		Hub Stoffels
		-gelegenheid tot snoeien van planten		Hub Stoffels
	za 13	Snoeidemo	Intratuin	Bestuur
december	do 20	Bloemschikken in kerstsfeer		Michel Veldman

Kerst 2017



In december werden o.l.v. Vera Wilders weer mooie kerststukken gemaakt. Zij had, samen met Thei, alles keurig voorbereid en de deelnemers konden aan de slag.



De toezichhouders....



De deelnemers waren enthousiast, hetgeen te zien is aan de manier waarop er gewerkt wordt. Het was een gezellige, sfeervolle avond en de resultaten mochten er zijn, getuige de foto's op deze pagina. Bloemschikken staat ook weer op de agenda voor 2018 en wel voor Pasen en Kerst.



In een goede sfeer werken aan de kerstsfeer.



De meikever en uw gras!

In mijn jonge jeugdjaren, al weer meer dan zestig jaar geleden, was de meikever groot in aantal. Tevens was hij door zijn grote aantallen berucht. Niet de kever zelf, al kon hij ook bomen kaal vreten, maar zijn nakomelingen.

Als afscheiding van het perceel van mijn ouders met de openbare weg stond een beukenhaag en laat die nu geliefde bladeren voor de meikever vormen. Voor de beukenhaag stond een toen nog houten lantaarnpaal en wanneer we tegen de schemering nog buiten speelden hoorden we hoe de meikevers tegen het glas van de lamp vlogen en versuft op de grond vielen. Wij als kinderen zetten de beestjes in een sigarendoos en speelden met de ongevaarlijke kever. Toch vormden de kevers voor onze ouders een ander probleem. In de moestuin knaagden de nakomelingen aan de wortels van diverse groenten (aardappels en sla) met als gevolg dat de bladeren helemaal verwelkten.



Meikever.

Tegenwoordig zijn er niet zoveel meikevers meer, maar toch is er op veel plaatsen nog hinder door de vraatzucht van de larven.

Tegenwoordig worden vooral grasvelden aangetast en zelfs perfect onderhouden grasvelden van voetbalverenigingen kunnen niet aan de vraatzucht van de larven ontkomen. Het ging in 2017 zover dat er een voetbalwedstrijd moest worden afgelast vanwege de slechte staat van het veld veroorzaakt door de engerlingen, want zo worden de larven genoemd.

Herkennen van de meikever.

De meikever zelf is zo'n drie centimeter groot en het is een opvallend dier door zijn mooie, kastanjebruine dekschilden. Onder die dekschilden bevindt zich nog een paar vleugels. De kever vliegt dus met vier vleugels. Het gehele lichaam is licht behaard en wanneer we de kevers vasthielden in onze handen gaf dat een kriebelend gevoel. Opvallend zijn ook de sprieten en de vorm van de poten. De kever heeft zijn naam te danken aan het tijdstip waarop hij zich laat zien. Na een lang verblijf onder de grond komt de kever vooral in mei als de temperaturen van de grond redelijk warm zijn tevoorschijn.

Schade door de engerlingen.



Na de paring leggen de vrouwtjes op ongeveer vijftwintig centimeter diepte in de grond de eitjes. Het aantal is verschillend. Het kunnen er tien zijn, maar ook dertig. Dan gebeurt

Onder een kwijnende graszode.



er iets wonderlijks met de vrouwtjes. Een aantal vrouwtjes sterft, maar een ander gedeelte gaat weer op zoek naar eiken en/of beukenblaadjes, vreet zich rond en kruipt ergens anders weer in de grond om eitjes af te zetten. De eitjes die uitkomen vormen het eerste stadium van de cyclus en om te groeien hebben ze uiteraard voedsel nodig. Dat voedsel bestaat uit wortels van planten. De schade door de engerlingen is vaak duidelijk te zien in grasvelden. Hele vlaktes met verdord graas. De aanwezigheid wordt vaak verraden door kraaien, spreeuwen en merels. Zij wroeten met hun sterke snavel in het gras, trekken de graswortels los en het gras sterft. De ontwikkeling van



larve tot volwassen kever neemt drie tot vier jaar in beslag. De laatste fase van die

ontwikkeling vindt plaats op ongeveer een meter diepte in de grond.

Bestrijden van de keverlarven.

Engerlingen werden vroeger bestreden met chemische middelen, maar tegenwoordig gaat men op de biologische toer. De bestrijding in april/mei gebeurt nu door het inzetten van nematoden; kleine aaltjes die in de grond op zoek gaan naar voedsel en terecht komen bij de engerlingen. Zijn de aaltjes eenmaal in de engerling beland, dan scheiden ze een bacterie af waardoor de engerling gedood wordt. Tegelijkertijd ontstaat een nieuwe generatie nematoden en deze gaan op zoek naar engerlingen. Worden geen engerlingen meer gevonden dan sterven de nematoden. Nematoden zijn niet direct te koop in tuincentra; ze moeten besteld worden. Omdat de levenscyclus meerdere jaren beslaat kan het noodzakelijk zijn een behandeling met nematoden te herhalen.



Feromoonval.

Een bestrijding van de kever kan ook door het plaatsen van vallen, de zogenaamde feromoonvallen. In de val bevindt zich een lokstof, een stof die dezelfde geur geeft als de stof die de vrouwtjes afscheiden, waardoor de kever

in de val kruipt en er niet meer uit komt.

H. stoffels.



Auteur:	v.d. Brink 2008 NL	Bloei:	Rijk.
Bloem:	Dubbel, hangend aan stevige neutrale steel.	Bloeitijd:	Normaal.
Bloembuis:	Kokervorm, lichtroze.	Groeiwijze:	Opgaand.
Kelkbladeren:	Half omhoog, symmetrisch vierzijdig, kleur buiten- en binnenkant licht roze.		
Kroonbladeren:	Rozetvormige kroon, rond, normaal gebromd met gave rand.		
Helmdraad:	Paars. Vier korte en vier lange meeldraden.	Blad:	Ellipsvorm, top spits, rand licht getand.
Helmknop:	Paars.	Knop:	Tolvormig. Twee knoppen per bladoksel.
Stuifmeel:	Grijs.	Kweekwijze:	Struik voor koele plaats
Stijl:	Paars.	Bijzonderheden:	Beste kleur in gefilterd licht.
Stempel:	Crème, gelobd.		



INTRATUIN HEEFT **ALLES VOOR** *huis, tuin en dier*

OPENINGSTIJDEN:

Ma, di, wo, vr van 9.30 - 18.00 uur

Donderdag 9.30 - 20.00 uur

Zaterdag 9.00 - 17.00 uur

Zondag 12.00 - 17.00 uur

Intratuin Geleen Egelantier 19, Geleen.

Intratuin Dierenwereld Egelantier 70, Geleen.



Weet u het antwoord?

Mail dat dan naar info@vfkl.nl

Een schip ligt gemeerd aan de pier. Aan de zijkant hangt een touwladder met een lengte van 330 cm. Tussen elke trede is 30 centimeter en de onderste trede raakt het water. Tijdens vloed stijgt het water met 15 centimeter per uur. Hoe lang duurt het voordat de bovenste trede in het water verdwijnt?



CBW erkend

www.rademakersparket.nl

Marcellienstraat 14 Tel: 046-4757286
6166 CR Geleen Gsm: 06-22684112



Volkstuintjes in Nederland
omgeven door bananenplanten.

Mooi, maar geen opvallende bloemen.

Heel veel kuipplanten worden mooi gevonden omdat ze met onopvallende bloemen en die toch bijzonder mooi kunnen zijn. Kijk maar eens naar bovenstaande foto, genomen in een volkstuincomplex te Guttecoven. De bananenplanten staan er fantastisch bij. De bladeren zijn nog gaaf. Ze hebben dat jaar niet geleden van de storm. Veel mensen kijken vreemd op als ze deze planten in de volle grond in dit volkstuincomplex zien staan. De Musa basjoo of vezelbaan is afkomstig uit China in de buurt van het Himalayagebergte en is gewend aan wat lagere temperaturen. Met enkele voorzorgsmaatregelen in de winter kan de plant in ons gematigd klimaat redelijk goed

overwinteren. Deze soort wordt in het land van herkomst niet gekweekt vanwege zijn vruchten, maar vanwege zijn vezels. Er groeien hier wel banaantjes aan, maar deze worden niet rijp. Voor de tuin toch een mooi gezicht zo'n groep bananenplanten.

Zachte winters overleven de planten op de "Guttecovense" manier, maar wanneer het hard gaat vriezen moet de plant degelijk ingepakt worden. De eerste nieuwe scheuten verschijnen vanaf april. Dan mag het pakmateriaal



In de winter dient het gedeelte boven de grond ter bescherming van de wortels.



Vele kleine banaantjes die niet rijp worden.

verwijderd worden en als het toch nog gaat vriezen pakt men de jonge scheuten in in vliesdoek.

Mooi in de tuin en zonder opvallende bloemen zijn enkele palmen. De meest bekende en de meest aangeplante is



Een schitterende *Trachycarpus fortunei* in een kleine kuip.

Trachycarpus fortunei afkomstig uit China, alwaar hij in de bergen groeit. In de Nederlandse tuin vindt men deze plant steeds meer en dan niet alleen als kuipplant, maar ook als palmboom in de volle grond. Belangrijk bij de aanschaf is te weten waar de palm vandaan komt. Planten die gekweekt zijn in de Pyreneeën zijn reeds aan koude gewend en passen zich makkelijker aan. Ze hebben geen warm klimaat nodig om te groeien. Ze groeien ook in ons koele, vochtige klimaat en belangrijk daarbij is dat ze niet te diep geplant worden. Bovenstaande *Trachycarpus fortunei* staat in gewone potgrond in een toch wel vrij kleine bak. Belangrijk is een goede waterafvoer en een goede voeding. In dit geval wordt palmenvoeding gebruikt en consequent gegeven. Toch moet niet overdreven worden.

De bladeren verschijnen bovenop de stam en verdroogde of kapotte bladeren kunnen zonder probleem verwijderd worden. Het aan de stam verwijderen van oude, verdroogde bladeren stimuleert de groei van de plant.

Wil men de plant mooi houden dan zet men ze enigszins beschut. De bladeren lijden dan minder.

Met het verschil volle grondplant en kuipplant moet men rekening houden. Planten in de volle grond hebben het makkelijker dan planten in een kuip. In de volle grond is een natuurlijke afwatering en er is bovendien meestal water beschikbaar. In een kuip is de plant afhankelijk van

de liefhebber. Belangrijk is dat er een goede waterafvoer is. Het liefst heeft de plant regenwater en dat kan het best gegeven worden als een regenbui, zodat zowel bladeren als wortelkultuur van het water kunnen profiteren.

Winterharde waaierpalm.

Iedereen beweert dat deze palm winterhard is. Ja, een korte vorstperiode van -18°C kan de plant aan. (in de volle grond), maar in een kuip is dat anders. Wanneer het diverse dagen 's nachts en overdag matig blijft vriezen moet de plant ingepakt worden en de als kuipplant gehouden *Trachycarpus* moet naar binnen of ook ingepakt worden. Dat geldt dan voor de kuip en voor het bovengrondse deel. De kuip inpakken in noppenfolie en de kroon in jute of vliesdoek.

Een palmboom is eigenlijk een stam waarop de waaievormige bladeren en bloemen staan.

De titel van dit artikel is: "Mooi, maar geen bloemen." Dat laatste is helemaal niet juist. Ook de palmboom *Trachycarpus* levert

bloemen, maar deze bloemen zijn zo klein dat ze niet opvallend zijn. De bloemen verschijnen in trossen. Het bijzondere van deze palm is dat hij tweehuizig is. Dat wil zeggen dat een *Trachycarpus* of vrouwelijke of mannelijke bloemen heeft. Een mannelijke *Trachycarpus* kan dus nooit zaden dragen.

Een andere palm die het goed in ons klimaat doet is ***Chamaerops humilis*** of **Europese dwergpalm.**

Dit is een oorspronkelijk Europese palmensoort. Komt uit



Deze *Chamaerops humilis* staat in een kuip.

het zuiden van Spanje en is daar veel warmte en zonneschijn gewend. Het is een kleine palm met vezelige bladeren en op de bladstelen zitten scherpe stekels. Het is een prima kuipplant maar door de beperkte wortelkultuur moet de plant regelmatig water krijgen, zeker wanneer ze in de volle zon staat. In de volle grond wortelt de plant erg diep. Ook deze kuipplant hoeft niet snel naar een winterberging, want ze overleeft vriestemperaturen van

-13°C. Mijn gekuipte *Chamaerops humilis* staat al gedurende vijf jaren zonder bescherming het hele jaar in de tuin. In het voorjaar strooi ik wat Culterra op de pot en wanneer ik water geef zakt wel wat voeding naar de wortels.

Aan de plant verschijnen zijstammetjes. Met deze stammetjes zou men de plant kunnen vermeerderen. Met stekpoeder en warmte lukt dat. De zijstammetjes maken van de plant een bossig geheel. Om de plant mooi te houden worden de bruin gekleurde balderen verwijderd.

Mooi, maar ook zonder bloemen is **Cordyline australis**, afkomstig uit Australië en Nieuw-Zeeland, een sierlijke plant met een tropische uitstraling. Cordyline's behoren niet tot de palmen, maar tot de Dracaena's. Bij



Cordyline australis is beeldbepalend in mijn tuin.

verzamelaars van kuipplanten kom je deze oorspronkelijk uit Nieuw-Zeeland afkomstige plant vaak tegen.

In mijn tuin staan ze als kuipplanten in een platte schaal en daarin staan ze al jaren. Ze zijn nog zeer mooi en zeker in de zomer met ouderwetse sedum als onderbeplanting. In de zomer is, vanwege de geringe potinhoud, regelmatig water geven noodzakelijk. De wortelkluit mag niet kletsnat blijven. Ze zijn geplant in gewone potgrond en doordat er in de potten veel drainage gaten zitten doen ze het uitstekend, ook in natte periodes.

Na een aantal jaren zijn ze de platte schaal ontgroeid en moet ik ze verpotten. Grotere schalen zijn niet verkrijgbaar en daarom worden ze in een grote containerpot geplant. De Cordyline's blijven lang buiten staan. Ze kunnen enkele graden vorst verdragen en mocht het meer gaan vriezen dan zet ik ze op een vorstvrije plaats binnen.

Mijn Cordyline's krijgen dezelfde voeding als de fuchsia's en ze groeien prima. De concentratie van de voeding is gering, maar die krijgen ze bij elke keer dat ik water geef. Zowel de Cordyline's als de sedums hebben geen last van ziektes. Heel af en toe kan er schade ontstaan door schimmels in een kroon die lang nat blijft.

Mocht de stam te hoog worden of mocht de kroon lelijk geworden zijn, dan kan men de stam ergens afzagen. Op de plaats waar de plant afgezaagd is verschijnen nieuwe groeipunten, maar het kan ook zijn dat er vanuit de wortels nieuwe planten verschijnen.



Een afgezaagde Cordyline springt weer uit.

Regelmatig sterven er bladeren af onder de kroon. Deze bladeren kunnen verwijderd worden en uiteindelijk krijgt men een mooie cordyline op stam. Cordyline's zijn er in enkele kleuren zoals bruin, groen, rozerood en de gemengde geelgroene kleur.

Een andere subtropische boom met weinig opvallende bloemen en afkomstig uit het Middellandse Zeegebied is de olijfbom of **Olea Europea**. Bomen die al enkele jaren oud zijn kunnen in de volle grond onze winters overleven, maar..... Het beste kan men de olijfbom houden als kuipplant. Wanneer de olijfbom nog jong is kan men hem gemakkelijk naar binnen halen tijdens een strenge vorstperiode, maar wanneer het een oude olijfbom betreft in een pot van een kubieke meter heeft men een probleem. In de winter houdt de plant zijn blad en kan lang buiten blijven staan.

De meest geschikte standplaats is een plek in de volle zon. Hij groeit in bijna elke potgrond, maar deze moet, ook in de zomer, niet te nat gehouden worden.

Ook de olijfbom kan bloeien, maar dat kan pas als de boom enkele jaren oud is. De bloemen verschijnen in de maanden mei en juni in een crèmewitte kleur, maar ze verschijnen pas wanneer de boom een koude periode doorgemaakt heeft. Voor het vormen van vruchten moet



Drie olijfbomen als drie Muskietiers.

de boom minstens vijf jaar oud zijn en dan ook nog op de juiste manier gesnoeid zijn. Een tak die vruchten heeft gedragen zal dat het volgende jaar niet meer doen en daarom moet die tak ingesnoeid worden. Maar het is eigenlijk vergeefse moeite, want de vruchten worden in ons land niet rijp. Wat men met snoeien bereikt doet men dus alleen maar voor het oog. De takken kan men in het voorjaar insnoeien om zodoende een dichtere kroon te laten vormen. De olijfbroom is een makkelijke plant, ook wat voeding betreft. Men kan organische voeding geven, maar ook minerale voeding. Koemestkorrels of siertuinmest kan prima resultaten opleveren.

De olijfbroom kan men gemakkelijk stekken. Dat gebeurt het beste in de zomer en men gebruikt dan halfverhoude stekken.

De volgende in deze serie is **Fatsia japonica**. (Vingerplant)



Deze Fatsia japonica beschermt zich tegen uitdroging door de bladeren slap te laten hangen.

Deze, altijd groene plant, is afkomstig uit Japan hetgeen reeds in de naam vermeld is. In Nederland wordt ze als kamerplant en als kuipplant gekweekt. Als kamerplant houdt ze het niet lang uit. Het is een stevige groeier en in de woonkamer is de plant al gauw te groot. In de tuin begint dan het tweede leven. De plant heeft aan het einde van de lange stelen grote gevingerde bladeren, die er een beetje leerachtig uitzien.

De plant stelt weinig eisen aan de grond, wanneer deze maar voldoende vochtig is. Regelmatig water geven met voeding zorgt ervoor dat de bladeren er mooi glanzend uitzien. Ze kan in de zomer op elke plaats in de tuin of op het terras staan, maar ze geeft de voorkeur aan een plaats

in de halfschaduw. Afhankelijk van de staanplaats, in de volle grond of in een kuip, is de grootte. In de volle grond kan dat wel tot vier meter hoog zijn. Mocht ze te groot worden dan kan men ze op elke willekeurige plaats terugsnijden.

Fatsia japonica is winterhard tot ongeveer -10°C en op een beschutte plaats kan ze nog meer vorst verdragen.



Bloementros van de Fatsia.

Ook Fatsia japonica vormt tegen de herfst bloemen, maar deze zijn ook klein. De bloemen lijken op de bloemen van de klimop. Geen wonder want de Fatsia is ontstaan uit een kruising met klimop. Evenals bij de klimop worden er vruchtjes gevormd, die wanneer ze rijp, zijn zwart van kleur zijn.

Naast de gewone groene kleur bestaat er ook een mooie Fatsia japonica variegata. Het is toch een plant om van te genieten, want ik sleep ze overal naar waar maar plek is in de tuin en mocht ze te groot worden dan kan ik ze inkorten en na enige tijd loopt ze weer uit. De jonge scheuten kan men dan weer stekken en zo blijft men constant vernieuwen.

De laatste in deze serie is een liguster soort. Het is **Ligustrum japonicum "Rotundifolium"**. Het is een altijd groene, traag groeiende plant die het prima doet in een pot of kuip. De plant draagt in juli/augustus trosjes met witte, geurende bloemen, maar de echte sierwaarde zit toch in het mooie groene leerachtige enigszins gekrulde blad. Langs het pad naar de voordeur staan twee exemplaren. Ze staan er zomer en winter en ze worden een beetje verwaarloosd, want ze stellen weinig eisen. Door de trage groei blijven de planten compact en is snoeien overbodig. Alleen wanneer het matig tot streng vriest gaan de planten naar binnen. Dat is omdat ze in een pot staan, want in de volle grond zijn ze winterhard.



Een bijna onverwoestbare Ligustrum japonicum "Rotundifolium"

Helleborusbladeren verwijderen.

In de winter steken de knoppen van de Helleborus orientalis en de vele cultivars hun neuzen boven de grond. In het verloop van de winter leveren ze veel bloemen. Toch heeft de Helleborus twee nadelen: de bloemen zitten



verscholen tussen de bladeren en kijken allemaal naar de grond. Aan het eerste nadeel kan de tuinbezitter iets doen. Wanneer de bloemen er zijn kan men de bladeren verwijderen. Ze zijn niet meer nodig. Vóór de bloei dienden ze als

bescherming van de plant en de knoppen, maar wanneer de plant bloeit kan men ze verwijderen. Dan ziet men in ieder geval van elke struik de mooie bos bloemen. Aan het naar de grond kijken kan men niets veranderen.



Het verwijderen van de bladeren moet echter

niet te vroeg gebeuren, immers de bladeren moeten zorgen voor de energie bij de knopvorming en nieuwe bladvorming. Is men te vroeg met verwijderen, dan wordt het aantal bloemen kleiner en ontwikkelen de nieuwe bladeren zich later. December is een goede tijd.

Het is zeer sterk aan te raden de bladeren te verwijderen wanneer deze zwarte vlekken hebben. Ze zijn dan aangetast door een schimmel die zich snel verspreiden kan.

Helleborussen kunnen worden geplant vanaf maart tot aan het einde van de herfst. Het mengen van organische mest onder de grond zorgt voor een rijke bloei.



Bevriezen de planten in de winter?

Helleborussen zijn winterhard, maar tijdens een vorstperiode schakelen ze hun verdamping uit door de bladeren slap te laten hangen. Ze trekken het vocht uit de bladeren, maar wanneer de vorstperiode voorbij is gaan de bladeren weer rechtop staan en bloeien ze verder.



primasta®

Potgronden en substraten



FLOWER POWER

www.primasta.nl

succes kweek je met Primasta



Café Keulen.
Schoolstraat 3
6343 CD Klimmen

**Het adres voor uw bruiloften, feesten,
recepties, lunches/koffietafels, cursussen,
trainingen en vergaderingen.**

Wij zijn het gehele jaar geopend.

Bel vrijblijvend voor een afspraak.
045 4051241
tomkeulen@gmail.com

Problemen met de Chinese roos.

Tijdens een van de bijeenkomsten van 2017 werden enkele planten van de Chinese roos verloot. Van nature heeft de struik lange, slappe takken, maar de verlote planten waren zeer compact.



beslist worden of de plant al dan niet verpot moet worden. Water geven aan een Hibiscus rosa-sinensis is erg moeilijk gezien de gevoeligheid van de wortels voor wortelrot. Mijn hibiscussen staan allemaal op een schotel en daarop geef ik water. Wanneer de schotels na twintig minuten niet leeg zijn gooi ik het water weg en controleer ik de vochtigheid van de wortelkluit. Deze moet eerst weer aandrogen voordat er opnieuw water wordt gegeven. Met de juiste manier van water geven, met de juiste voeding en met de juiste temperatuur zal de hibiscus in de zomer weer mooi bloeien.

H. Stoffels

Het waren planten uit een kwekerij en daar worden ze behandeld met remstoffen. Als de remstoffen uitgewerkt zijn gaat de plant weer terug naar haar oorspronkelijke groeivorm en worden weer lange, slappe scheuten gevormd. Toch kan de bezitter met behulp van snoei en voeding tot een goed resultaat komen.

In oktober/november begint de plant aan haar rustperiode. Ze geeft dan de voorkeur aan een temperatuur van ongeveer 12°C en prefereert weinig water en geen voeding. Omdat de plant haar bladeren blijft behouden en er dus ondanks de lage temperatuur toch verdamping plaatsvindt is af en toe water geven noodzakelijk.

In het voorjaar zal de temperatuur in de verwarmde kas of tuinkamer weer regelmatig oplopen en heeft de plant weer meer behoefte aan water en voeding. Na controle van de wortelkluit kan al eind februari



\$%NOV2018#&

Bestel nu éénmalig met 10% KORTING!

Ga naar:

>> www.orchideeen-shop.nl <<

Het is groen.

Absint	Draak	Paradijsslang
Andijvie	Eikenbladroller	Peer
Aventurijn	Granny Smith	Prei
Berm	Gras	Reine-Claude
Biljartlaken	Groene Bijeneter	Rhyoliet
Bladluis	Groene Vleesvlieg	Riet
Bomen	Haricots Verts	Rups
Boomagaat	Hedera	Schildpadkever
Broccoli	Hulk	Schimmel
Camouflagepak	Jade	Skimmia
Chrysopraas	Krokodil	Spar
Cicade	Laurierkers	Staartvleczalm
Citroenvlinder	Lime	Tuin
Conifeer	Maretak	Watermeloen
Dipsy	Mike Wazowski	

Deze woordzoeker is een product van Denksport.

I	E	G	N	A	L	S	S	Y	D	A	R	A	P	M	H	R	A	N	S
N	K	I	L	O	C	C	O	R	B	W	I	T	M	A	E	D	E	P	S
A	R	E	D	E	H	S	I	O	A	K	E	L	R	T	K	K	U	G	C
S	O	R	R	U	K	D	O	T	S	I	A	I	E	M	A	R	A	R	H
I	K	P	L	I	I	M	E	W	R	U	C	N	B	L	T	H	V	E	I
U	O	K	M	P	A	R	O	L	R	O	E	N	T	A	E	Y	E	I	L
L	D	M	S	G	M	Z	E	I	T	Y	E	R	O	Z	R	O	N	N	D
D	I	Y	A	E	A	M	E	S	B	M	A	N	E	K	A	L	T	E	P
A	L	A	L	W	M	R	V	E	O	J	N	O	V	E	M	I	U	C	A
L	T	O	E	I	K	E	N	B	L	A	D	R	O	L	L	E	R	L	D
B	E	K	H	E	R	E	E	I	V	Y	D	N	A	V	I	T	Y	A	K
N	I	C	R	T	O	P	B	C	I	C	A	D	E	T	M	N	N	U	E
M	S	S	S	R	R	K	C	O	N	I	F	E	E	R	E	G	D	D	V
T	P	H	G	E	A	H	T	I	M	S	Y	N	N	A	R	G	A	E	E
U	T	L	K	A	P	E	G	A	L	F	U	O	M	A	C	J	Y	F	R
I	C	H	R	Y	S	O	P	R	A	A	S	Z	S	T	N	I	S	B	A
N	Y	D	N	G	R	O	E	N	E	V	L	E	E	S	V	L	I	E	G

Probeer bovenstaande woorden in de tabel door te strepen. De overgebleven letters vormen een uitdrukking.

Oplossing:

Doen planten ook aan seks?

Mensen doen het, dieren doen het en planten.....? Het antwoord op deze vraag is niet zo moeilijk. Ja, planten doen ook aan seks, maar dan op een heel andere manier dan mensen en dieren. Ook bij planten moet een zaadcel bij een eicel komen om nakomelingen voort te brengen. Dat bij elkaar komen van zaadcel en eicel noemen we bestuiving.

Planten zijn wat seks betreft veel vrijer dan mensen. Kijk



Chinese roos.

in de bloeitijd van de planten maar eens rond. Overal waar ze bloeien laten ze duidelijk hun mannelijke geslachtsorganen zien. Het zijn echte streakers! De ene bloem doet dat op een uitdagende wulpsse manier, de andere doet het op een obscene manier en steekt de geslachtsorganen ver boven de bloembladeren uit. Het is alsof ze hun middelvinger op uitdagende manier laten zien. Bovendien strooien ze, geholpen door de wind, zonder schaamte de geslachtscellen (stuifmeelkorrels) in het rond. We zwemmen in een zee van geslachtscellen zonder dat we er zelf weet van hebben, behalve dan de mensen die last hebben van hooikoorts.



Poederkwast.

Gelukkig voor de bloemen komen de stuifmeelkorrels niet alleen door de wind op de stampers. Ook wij mensen kunnen daarin actief zijn (veredelaars), maar ook vogels en insecten. Voor de vogels en de insecten hebben de meeste bloemen een



Een bij op zoek naar iets lekkers.


presentje. Ze mogen snoepen van het stuifmeel en/of van de zoete stof die ze herbergen, zij het soms met moeite.

Niet alleen de mannelijke delen gedragen zich onbescheiden. De vrouwelijke geslachtsdelen doen niet onder voor de mannelijke. De stampers zijn vaak nog duidelijker aanwezig dan de stuifmeeldraden. De vrouwelijke delen zijn niet vies van hun sekskeuze. De nakomelingen kunnen verwekt worden door verre verwanten, door familie of zelfs door henzelf.

De meeste planten zijn tweeslachtig, hetgeen betekent dat ze zowel vrouwelijke als mannelijke geslachtsorganen hebben. Toch kunnen veel bloemen niet hun eigen nakomelingen verwekken. Een mechanisme in de bloem van een tweeslachtige plant zorgt ervoor dat het stuifmeel van de mannelijke metgezel niet door de stamper geaccepteerd wordt. Er is dus stuifmeel van een andere plant nodig. Dit noemt men kruisbestuiving en geschiedt om inteelt en dus zwakkere nakomelingen te vermijden.

Voor de voortplanting kunnen planten zich niet verplaatsen zoals mensen en dieren. Zeker planten hebben seksuele hulpmiddelen nodig. Het meest eenvoudige hulpmiddel is de wind. Die zorgt ervoor dat de mannelijke stuifmeelkorrels op de vrouwelijke delen komen. Veel planten gebruiken specifieke dieren als stuifmeelvervoerders. Deze seksuele hulpmiddelen worden door planten "gekocht" en ze bieden een beloning aan in de vorm van stuifmeel en nectar. Maar hoe kunnen insecten die verlokingsmiddelen vinden? Planten hebben daarvoor hun eigen middelen. Veel bloemen prijzen hun beloning aan. Ze wijzen de insecten de weg. Dat kan gebeuren door opvallende kleuren, geur, formaat en vorm. Soms is echter de verhouding tussen bloem en bestuiver helemaal mis. Hommels hebben een voorliefde voor de bloempjes van het vergeet-me-nietje. Wanneer men dit schouwspel bekijkt kan men het lachen niet onderdrukken. De bloemsteeltjes van het vergeet-me-nietje buigen door tot op de grond onder het gewicht van de hommels.

Toch is het ook mogelijk de soort in stand te houden zonder seks. Sommige planten kunnen zichzelf klonen, hetgeen betekent dat de nakomeling een exacte kopie is van de moederplant. Veel kwekers klonen planten in laboratoria, maar door middel van afleggers, uitlopers of wortelstokken kunnen de planten dat zelf ook.



In het voorjaar zijn er maar weinig insecten. Daar moeten de bloemen het mee doen, maar daar hebben ze een oplossing voor. De meeste bloemen in het voorjaar zijn

geel, een felle opvallende kleur waardoor het geringe aantal insecten toch gelokt wordt.

Geuren zijn ook belangrijk in de insectenwereld. Vooral voor planten die 's avonds bloeien is geur belangrijk. De geur moeten we niet beoordelen naar menselijke maatstaven, immers stinken behoort ook tot de geur. De bloemen van de kamperfoelie ruiken heerlijk, maar de bloemen van de aronskelk verspreiden de geur van dode dieren en toch komen daar ook insecten op af. (aasvliegen)



Venusvliegenvanger.

Onder de planten bevindt zich ook een aantal bedriegers. Hun bloemen lokken de insecten met aantrekkelijke middelen: kleuren en geuren, maar eenmaal bij de lekkernij aangekomen worden ze gedood of opgepeuzeld. De venusvliegenvanger is een mooi voorbeeld.

Geen mens, geen dier, geen plant heeft het eeuwige leven. Middels seks moeten allen zorgen voor het nageslacht, maar wanneer de bevruchting geslaagd is en de


nakomelingen (zaden) gevormd zijn volgt vroeg of laat het einde.

H.Stoffels.




Reuzenaronskelk.

De ontwikkeling van bloem naar vrucht



1. Bloemsteel
2. Kelkbladeren
3. Kroonbladeren
4. Stamper (vrouwelijk voortplantingsorgaan)
5. Meeldraden (mannelijke voortplantingsorganen)



3. Kroonbladeren
4. Stamper
5. Meeldraden



1. Bloemsteel
2. Kelkbladeren
3. Vruchtbeginsel
4. Zaden
5. Meeldraden (restanten)



Kruisbestuiving
Van meeldraad klapproos naar stamper van de andere klapproos.



Geen bestuiving
Van meeldraad klapproos naar stamper van een roos.



Zelfbestuiving
Van meeldraad klapproos naar stamper van dezelfde klapproos.

Hoe graag insecten de nectar van bloemen willen hebben
laat deze serie foto's zien.



Deze wesp vindt de gebruikelijke
doorgang naar de nectar niet, maar
laat zich niet weerhouden dan
maar een gaatje in de bloem te
maken. Om bij de nectar te komen
moet ze zelf helemaal in de bloem
kruipen. De wesp vindt haar kostje
wel, maar de bloem heeft er geen
voordeel bij. De wesp raakt de
meeldraden niet.



Sneeuw en hagel, regen en wind, daarvan is maart een vrind.

Een droge maart en natte april, dat is naar de boeren hun wil.

QUADAKKERS
VERSMARKT EN MEESTERTRAITEUR
HET LEKKERSTE PLEKJE VAN LIMBURG
VIND JE IN VOERENDAAL EN NEERBEEK
WWW.QUADAKKERS.NL

**KWALITEIT
UIT EIGEN
KEUKEN**

Quadakkers Catering & Partyservice Hogeweg 24, 6367 BD Voerendaal 045 5 75 42 69
Quadakkers Slagerij & Delicatessen Furenthela 8-10, 6367 TL Voerendaal 045 5 75 12 60



De koningin van de winter.

Tips voor het hebben en houden van Camellia's.

Door het raam van de badkamer kijk ik elke morgen naar buiten en zie daar de koningin van de winter in volle glorie. Op dat moment denk ik: "Waar is Koning Winter?" Het is 1 januari 2018. De temperatuur ligt rond de 9°C, het is donker en het regent. Voor de liefhebbers van Camellia's enkele tips. Het is gemakkelijk ze te kopen, maar het is de bedoeling ze fit te houden en ervan te genieten.

Standplaats:

Het liefst staan camellia's in de halfschaduw. Ze houden in de winter en ook niet in de zomer van zon. Een plaats waar de schrale oostenwind de planten kan bereiken is ongeschikt, zeer zeker wanneer ook nog de zon bij de planten kan komen. Of ze nu in de volle grond staan of in een pot, als de wortelkluit bevroren is laten ze de knoppen vallen.

Ondanks haar tropisch uiterlijk is deze plant niet geschikt om tegen een muur op het zuiden te planten of neer te zetten in een kuip.

Grond:

Universele potgrond is geschikt, lichtzure grond is beter. Camellia's houden niet van kalk. In neutrale potgrond doen ze het goed. Universele potgrond gemengd met wat zure bosgrond of verteerde bladeren of grond van onder een dennenboom geeft een uitstekend substraat. Een zak rododendrongrond door de universele potgrond gemengd kan ook een goed substraat geven. De grond is vruchtbaarder te maken door het laten liggen van de afgevallen bloemen en bladeren.

Opgepot:

Alle camelliasoorten kunnen in een pot/kuip gehouden worden. Van december tot en met maart sieren ze de open plekken in mijn tuin om in april/mei, wanneer de warmte minnende kuipplanten weer naar buiten komen, weer naar de achtergrond te verdwijnen. Zet ze na aanschaf in een grotere pot zodat de wortelkluit zich kan ontwikkelen. Hoe meer wortels, hoe meer de voedselopname is. Camellia's staan graag in vochtige grond, maar de wortels hebben een hekel aan stilstaand water.

Water geven:

Gedurende het hele jaar hebben de planten behoefte aan water. Regenwater heeft duidelijk de voorkeur boven leidingwater. Het op de juiste manier water geven is belangrijk. Knopval kan het gevolg zijn van te veel of te weinig water. Een goede drainage is belangrijk, want in een kletsnatte grond kunnen zich schimmelziektes ontwikkelen. Camellia's in de volle grond kunnen niet te veel water krijgen, omdat daar een natuurlijke drainage is. Regenwater is te prefereren boven leidingwater.

Voeding:

Aan de bladeren van de planten is vaak te zien of ze gebrek aan voedsel hebben gehad. Veel gele bladeren betekent chlorose en is op te heffen door het geven van een stikstofrijke voeding zoals bloedmeel of hoornspaanders. Strooi de voeding op de wortelkruit, maar werk ze niet in de grond met een scherp voorwerp. Verdeel de organische voeding met de handen. Camellia's wortelen oppervlakkig en beschadiging van de wortels kan leiden tot wortelrot. Schoffel dus ook niet onder de camellia's die in de volle grond staan. Mest niet meer als de bloemknoppen gevormd zijn.

Snoeien:

Camellia's zijn in het algemeen goede groeiers, maar snoeien is alleen noodzakelijk wanneer de vorm niet mooi meer is of wanneer de plant ergens hindert. De beste tijd om te snoeien is na de bloeiperiode. Na de bloeiperiode volgt de groeiperiode en voor die groeiperiode kan men de vorm bepalen middels snoei. Flink snoeien mag, de planten herstellen prima. Aan de nieuwe scheuten ontwikkelen zich later weer de knoppen. In principe is snoeien niet nodig want van nature vormen ze mooie struiken. Daar de planten goed snoei verdragen is het ook mogelijk er een kroonboom van te maken.

Camellia's zijn afkomstig uit het verre oosten en er bestaan zo'n 80 soorten met bloemen die kleuren hebben van wit en crème tot paars en rood.

Uitgebloeide bloemen:


Uit esthetisch oogpunt kan men de uitgebloeide, verwelkte bloemen verwijderen, maar het is mooier wanneer er in de herfst "appeltjes" met zaden aan de struiken hangen. Omdat camellia's goede groeiers zijn lijden ze niet van het vormen van de zaden. De "appeltjes" zijn eerst groen en verkleuren naar roodbruin. Als ze rijp zijn springen ze open en vallen de zaden op de grond. Op die manier zaait de plant zichzelf uit. In mijn tuin staan enkele van die zaailingen en ik ben nieuwsgierig naar de kleur van de bloemen. Ik weet wel wie de moeder is, maar niet wie de vader is.

Plaagdieren:

In onze streken hebben camellia's weinig last van schimmels. De meeste last hebben ze van parasieten als schildluis en wolluis. Schildluizen zijn die kleine bruine plaatjes die onder de bladeren langs de nerven vastgeplakt zitten. Wolluizen zijn die witte langwerpige diertjes die goed verpakt aan de onderkant van de bladeren zitten. Beide scheiden een zoete stof af en die valt op de bladeren. Op deze stof (honingdauw) ontwikkelt zich een schimmel (roetdauw) en die kleurt de bladeren zwart. Met een nat washandje is dat zwarte spul te verwijderen. De insecten zijn te verwijderen met "Schädlingsfrei Neem"



Waar is koning winter?



De Krokus geeft de lente aan.



De herfsttijloos geeft de herfst aan.

In een weiland ergens in de buurt van Lasel (Duitse Eifel) stond tussen het lage gras eenzaam en alleen een mooie op een krokus lijkende bloem. Enkele weken na het terugsnoeien van de fuchsia's en de bladverliezende kuipplanten gaan we samen een week op vakantie in de Eifel. Tijdens een van die wandelingen zag ik de bloem staan zonder bladeren. Ik herkende ze meteen. Het was een herfsttijloos of met een geleerde naam *Colchicum*, in dit geval *Colchicum autumnale*. Evenals de krokus is de herfsttijloos een knolgewas, maar de bladeren en zaden van deze plant verschijnen pas in het voorjaar. In die tijd moet de bol weer reserve voedsel opslaan voor de bloei van de volgende herfst. Met een krokus heeft deze plant niets van doen, al lijkt de bloem veel op een krokusbloem. De krokus behoort tot de irisachtigen, terwijl de herfsttijloos tot de lelieachtigen wordt gerekend. Wanneer men het verschil wil ontdekken moet men naar de meeldraden op zoek gaan. Bij de herfsttijloos vindt men zes meeldraden, terwijl de krokus er maar drie heeft. Al is de krokus de aankondiger van de lente, dat wil niet zeggen dat er in de herfst geen krokussen bloeien. Dat zijn dan de zogenaamde herfstkrokussen en wil men echt weten of het krokussen zijn, dan kan men de meeldraden tellen.

In de herfst zijn de bolletjes in de tuincentra te koop, maar de bolletjes zijn niet zo mooi gevormd als die van de krokus. Dus laat ze niet liggen vanwege hun uiterlijk, want dat klopt helemaal niet met het bloeieresultaat. In de tuin kunnen de gekweekte planten een plaatsje vinden in de schaduw. Ze vermeerderen zich snel en in de herfst stelen ze de show omdat er nog maar weinig planten in bloei staan. Naast de *Colchicum autumnale* zijn er nog meerdere soorten te koop in andere kleuren. Het beste resultaat verkrijgt men wanneer men een groep bij elkaar plant.

Na verloop van tijd kan het aantal bolletjes zo groot zijn dat ze elkaar, net zoals bij sneeuwkllokjes, uit de grond duwen. Dan is het tijd de bollen uit elkaar te halen en evenals bij sneeuwkllokjes kan dat het beste gebeuren in de bloeiperiode. Het beste kan het uit de grond halen met een riek of spitvork gebeuren en niet met een schop. Heeft men de groep uit de grond, dan kan men ze voorzichtig uit elkaar trekken en weer elders planten op een diepte van ongeveer vijftien centimeter en omdat de bollen snel in aantal toenemen plant men elke bol apart op ongeveer tien centimeter van elkaar. In de herfst is de tuin meestal leeg, maar dat wil niet zeggen dat er niets meer te genieten valt. Een mooie groep *Colchicums* zorgt ervoor dat het seizoen niet in mineur eindigt.

Wist u dat de herfsttijloos een uitstekende droogbloeiër in de huiskamer is? *Colchicum autumnale* is afkomstig uit Zuid-Europa en Klein-Azië.

H. Stoffels

Fuchsia's & Pelargoniums

voor een bijzonder assortiment

- 3600 soorten Spek Fuchsia's
- 350 soorten Pelargoniums
- eenjarige zomerbloeiers
- zomerbloemenpluktuin
- groenworkshops voor groepen

We verzenden ook bewortelde stek, kijk hiervoor op www.kwekerijvandervelde.nl

Catalogus 2014 met vele nieuwe Fuchsia's en pelargoniums, verkrijgbaar door €5,95 over te maken op IBAN:NL31RABO 0154673951

Openingstijden:

1 mrt t/m 28 juni	ma t/m za	9:00 - 12:00 uur
		13:00 - 17:00 uur

2 juli t/m 25 okt	wo, do	9:00 - 12:00 uur
	vr, za	9:00 - 17:00 uur

2e Paasdag, Hemelvaartsdag, 2e Pinksterdag, Koningsdag | 11:00 - 17:00

1 maart aanvang Fuchsia en Pelargonium verkoop

kwekerij
Van der Velde

Borchgraverweg 3a | 8181RW Heerde | Tel. 0578-695727
www.kwekerijvandervelde.nl | info@kwekerijvandervelde.nl

Gulzig.

In veel Europese landen leven veel soorten lieveheersbeestjes waarvan het zevenstippelig en tweestippelig lieveheersbeestje het meest voorkomen. De larven van de beestjes hebben een langwerpige grijsblauw lichaam met donkere plekken en oranje-gele verdikkingen. Aan de voorzijde hebben ze goed ontwikkelde zwarte poten. Ze voeden zich met bladluizen, schildluizen en spintmijten. De larven vreten meer insecten op dan de volwassen beestjes. Reden dus om zowel de volwassen dieren en de larven te beschermen, want een volwassen larve eet vele tientallen luizen per dag.

VANDENDIJK
SERREBOUW

LJW AFDAK, ONS VAK



ORANGERIES | AFDAKEN | SCHUIFWANDEN | CARPORTS | OVERKAPPINGEN | AIRCO'S | VERWARMING | SERRES - KASSEN

Weestersteenweg 451, Kinrool / Molenbeersel
089 700 130
www.vandendijk.be

Maandag t/m donderdag: 8.30u - 12.00u & 13.00u - 18.00u
Vrijdag: 8.30u - 12.00u & 13.00u - 17.00u
Zaterdag: 8.30u - 12.00u
Zon & feestdagen: gesloten

Colofon:

Redactie CultiVaria:

Hub Stoffels
Jan Ramaekers

Opmaak en verzorging:

Hub Stoffels
Bornerweg 15
6141BJ Limbricht
Tel. 046-4510323
E-mail hj.stoffels@home.nl

www.vfkl.nl

Aanleveren kopie:

4 weken voor het verschijnen van het clubblad.

3 weken voor mededelingen bestuur.

Voor technische vragen:

Hub Stoffels
Tel. 046-4510323
E-mail info@vfkl.nl

Voorzitter: Vacant

Een dagelijks bestuur bestaande uit Annelies Weijers, Jan Ramaekers en Hub Stoffels behartigt voorlopig de belangen van de vereniging.

Vice-voorzitter: Hub Stoffels

Secretaresse:

Annelies Weijers
Burg. van Laarstraat 48
6267 ET Cadier en Keer
Tel 043-4072217
E-mail secretariaat@vfkl.nl

Penningmeester:

Jan Ramaekers
Vleugelmorgenstr. 13
6171NN Stein
Tel. 046- 4333275

Bestuursleden:

Francien Mast
Hannelore Stevelmans
Michel Veldman (materialen)
Jo Sieler
Roy Beckers
Annelies Hellenbrand

Activiteiten:

Hannelore Stevelmans
Francien Mast

Grote Clubactie:

Annelies Hellenbrand.

Inzake betalingen:

VFKL

Voor alle betalingen
IBAN nummer:

NL 17 Rabo
016.99.32.206

CultiVaria aan huis.

Indien men verzekerd wil zijn van elke nieuwe uitgave kan men er voor kiezen het blad met de post te laten bezorgen. Voor leden kost dat € 12,50. Mensen die geen lid zijn kunnen zich ook abonneren op het blad. Zij betalen daarvoor dan € 17,50 en krijgen het blad vier keer per jaar bezorgd. Overmaken op bovenstaand banknummer o.v.v. naam en adres is voldoende.



Kwekerij Zeelenberg
Fazantenweg 8
5106 RC Dongen

www.kwekerijzeelenberg.nl

Tel. 06-53270502

*Al ruim 25 jaar gespecialiseerd in
Fuchsia's en Pelargoniums!*

Ruim 1200 soorten fuchsia's
200 soorten pelargoniums



*Mooi assortiment wintervaste planten.
En verder in het voorjaar natuurlijk
pelargoniums, fuchsia's, knolbegonia's,
perkplanten, zomerbloeiërs en nog veel meer!*

U bent van harte welkom!



KWALITEIT VOOR EEN LAGERE PRIJS

Voorjaars bloeiërs uit eigen kwekerij



HENDRIKS

& KWEKERIJ
KESSEL

VIOOLTJES
uit eigen kwekerij!
60 kleuren en soorten **€ 0,25 p.st.**

**VOORJAARSBLOEIERS
& VASTE PLANTEN**
uit eigen kwekerij! **€ 0,60 p.st.**

KAMERPLANTEN
Vernieuwde afdeling!

SNIJBLOEMEN:
Tulpen, Rozen & Anthurium
boeketten

BEZOEK OOK ONZE BUITENAFDELING!
Ruime keuze bomen, Hortensia's, Rhododendrons, etc.

Aan de Napoleonsbaan
10 min. vanaf Venlo
10 min. vanaf Roermond

P 150 GRATIS
parkeerplaatsen

f VOLG OS
OP FACEBOOK

Postadres: Veldweg 1, 5995 PG Kessel
Voor navigatie: Roode Eggeweg 5A, 5995 PH Kessel
T.(077)462 1630 | WWW.WIMHENDRIKS-PLANTEN.NL
Openingstijden: Ma-Vr 09.00-18.00 uur, Zat: 09.00-17.00 uur
Voor speciale openingstijden & koopzondagen; bezoek onze site.